

Hinweise zur Anwendung von Iricryn 0,3 mg/ml Augentropfen, Lösung:

- 1 Waschen Sie Ihre Hände sorgfältig, bevor Sie dieses Arzneimittel anwenden.
- 2 Wenn die Verpackung oder Flasche beschädigt ist, verwenden Sie das Arzneimittel nicht.
- 3 Wenn Sie das Arzneimittel zum ersten Mal verwenden, schrauben Sie die Kappe ab, nachdem Sie sichergestellt haben, dass der versiegelte Ring an der Kappe nicht gebrochen ist. Sie sollten einen leichten Widerstand spüren, bis dieser manipulationssichere Ring abbricht (Bild 1).
- 4 Wenn der manipulationssichere Ring lose ist, werfen Sie ihn weg, da er ins Auge fallen und Verletzungen verursachen kann.
- 5 Neigen Sie Ihren Kopf nach hinten und ziehen Sie das untere Augenlid vorsichtig nach unten, um einen Beutel zwischen Auge und Augenlid zu bilden. Vermeiden Sie den Kontakt zwischen der Flasche und Ihren Augen, Augenlidern oder Fingern.
- 6 Geben Sie einen Tropfen in den Beutel, indem Sie langsam auf die Flasche drücken (Bild 2). Drücken Sie die Flasche vorsichtig in der Mitte und lassen Sie einen Tropfen in Ihr Auge fallen. Zwischen dem Drücken und dem Herauskommen des Tropfens kann es einige Sekunden dauern. Drücken Sie nicht zu fest. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie Ihr Arzneimittel verabreichen sollen, fragen Sie Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal.
- 7 Drücken Sie den Tränenkanal etwa 2 Minuten lang zusammen (indem Sie mit einem Finger auf den inneren Augenwinkel neben der Nase drücken), schließen Sie die Augen und halten Sie sie während dieser Zeit geschlossen (Bild 3). Dies stellt sicher, dass der Tropfen vom Auge absorbiert wird und dass die Menge an Medikamenten, die durch den Tränenkanal zur Nase abfließt, wahrscheinlich verringert wird.
- 8 Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 in Ihrem anderen Auge, wenn Ihr Arzt Sie dazu aufgefordert hat.
- 9 Nach dem Gebrauch und vor dem Wiederverschließen sollte die Flasche einmal nach unten geschüttelt werden, ohne die Tropfspitze zu berühren, um Flüssigkeitsreste auf der Spitze zu entfernen. Dies ist notwendig, um die Lieferung nachfolgender Tropfen sicherzustellen. Nach der Anwendung den Deckel auf die Flasche schrauben (Bild 4).
- 10 Zusätzliche Informationen für die Flasche mit 9 ml Lösung: Am Ende der 90-tägigen Anwendung des Arzneimittels bleibt eine Restmenge Iricryn in der Flasche zurück. Versuchen Sie nicht, diesen in der Flasche verbliebenen Rest zu benutzen. Benutzen Sie die Augentropfen nicht länger als 90 Tage nach dem ersten Öffnen der Flasche.



Bild 1



Bild 2




Bild 3



Bild 4

Wenn ein Tropfen Ihr Auge verfehlt, versuchen Sie es erneut.