

Hinweise zur Anwendung von von Lifog 50 Mikrogramm/ml Augentropfen, Lösung:

- 1 Waschen Sie Ihre Hände und setzen oder stellen Sie sich bequem hin.
- 2 Entfernen Sie die äußere Schutzkappe von der Flasche (Bild 1).
- 3 Halten Sie die Flasche kopfüber mit dem Daumen auf die Schulter der Flasche und den anderen Fingern auf dem Flaschenboden (Bild 2). Pumpen Sie die Flasche vor dem ersten Gebrauch wiederholt, ungefähr 10 Mal, bis der erste Tropfen austritt.
- 4 Neigen Sie Ihren Kopf nach hinten und ziehen Sie das untere Augenlid vorsichtig nach unten, um eine Tasche zwischen Auge und Augenlid zu bilden.
- 5 Bringen Sie die Flaschenöffnung nahe an das Auge, ohne es zu berühren.
- 6 Drücken Sie die Schulter der Flasche und die Unterseite der Flasche nach unten, sodass nur ein Tropfen in Ihr Auge gelangt, und lassen Sie dann das untere Augenlid los (Bild 3).
- 7 Drücken Sie 1 Minute lang mit einem Finger auf den inneren Augenwinkel neben der Nase (Bild 4). Halten Sie das Auge dabei geschlossen.
- 8 Wenn es Ihr Arzt verordnet hat, wiederholen Sie den Vorgang an Ihrem anderen Auge.
- 9 Verschließen Sie die Flasche wieder mit der Schutzkappe.



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4

Verwenden Sie jeweils nur eine Flasche des Arzneimittels. Öffnen Sie die Schutzkappe erst, wenn Sie die Augentropfen anwenden müssen. Sie müssen die 2,5-ml-Flasche 30 Tage und die 7,5-ml-Flasche 90 Tage nach dem ersten Öffnen wegwerfen, um Infektionen zu vermeiden, und eine neue Flasche verwenden.

Notieren Sie sich das Datum, an dem Sie die Flasche geöffnet haben, in das Feld auf dem Karton, um die Haltbarkeit nach dem Öffnen der Flasche besser kontrollieren zu können.