

# Hinweise zur Anwendung von Bapiri 0,3 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen, Lösung

**1** Waschen Sie Ihre Hände sorgfältig, bevor Sie dieses Arzneimittel anwenden.

**2** Wenn die Verpackung oder Flasche beschädigt ist, verwenden Sie das Arzneimittel nicht.

**3** Wenn Sie das Arzneimittel zum ersten Mal anwenden, schrauben Sie die Kappe ab, nachdem Sie sichergestellt haben, dass der versiegelte Ring an der Kappe nicht gebrochen ist. Sie sollten einen leichten Widerstand spüren, bis dieser manipulations sichere Ring abbricht (Bild 1).



Bild 1

**4** Wenn der manipulations sichere Ring lose ist, werfen Sie ihn weg, da er sonst ins Auge fallen kann.

**5** Neigen Sie Ihren Kopf nach hinten und ziehen Sie das untere Augenlid vorsichtig nach unten, um eine Tasche zwischen Auge und Augenlid zu bilden. Vermeiden Sie den Kontakt zwischen der Flasche und Ihren Augen, Augenlidern oder Fingern.



Bild 2

**6** Geben Sie einen Tropfen ins Auge, indem Sie sanft auf die Flasche drücken (Bild 2). Drücken Sie die Flasche vorsichtig in der Mitte und lassen Sie einen Tropfen in Ihr Auge fallen. Zwischen dem Drücken und dem Herauskommen des Tropfens kann es einige Sekunden dauern. Drücken Sie nicht zu fest.

**7** Drücken Sie den Tränen-Nasen-Kanal etwa 2 Minuten lang zusammen (indem Sie mit einem Finger gegen den Augenwinkel nahe der Nase drücken), schließen Sie die Augen währenddessen und halten Sie sie geschlossen (Bild 3). Dies stellt sicher, dass der Tropfen vom Auge aufgenommen wird und verhindert, dass das Arzneimittel in den restlichen Körper gelangt.



Bild 3

**8** Wiederholen Sie die Schritte 5, 6 und 7 an Ihrem anderen Auge, wenn Ihr Arzt Sie dazu aufgefordert hat.

**9** Nach dem Gebrauch und vor dem Wiederverschließen sollte die Flasche einmal nach unten geschüttelt werden, ohne die Tropferspitze zu berühren, um Flüssigkeitsreste von der Spitze zu entfernen. Dies ist notwendig, um die Abgabe nachfolgender Tropfen sicherzustellen. Schrauben Sie nach der Anwendung den Deckel wieder auf die Flasche (Bild 4).



Bild 4

Wenn ein Tropfen Ihr Auge verfehlt, versuchen Sie es erneut.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie Ihr Arzneimittel anwenden sollen, fragen Sie Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal.